

Effets de la chimiothérapie sur la vessie

Quel est l'effet des traitements sur la vessie?

L'urine est produite par les reins puis transite par la vessie. Certains médicaments peuvent la colorer en rouge, jaune ou bleu selon la couleur du produit administré. Ceci est sans conséquence. C'est un signe que la chimiothérapie est éliminée.

D'autres médicaments peuvent provoquer une inflammation de la vessie et entraîner des saignements visibles dans les urines quelques heures à quelques jours après l'administration. Afin de prévenir ce risque, l'oncologue prescrit un traitement complémentaire protecteur pour la vessie avant chaque nouvelle séance de chimiothérapie.

Si cette inflammation survient malgré tout, elle est sans danger mais peut être inconfortable.

Chaque situation est particulière. Les effets secondaires ne surviennent pas en toute situation et ils varient selon le traitement et selon les personnes. Avant le début du traitement, l'équipe soignante vous informe des effets potentiels. N'hésitez pas à lui faire part de vos questions et préoccupations.

Que faut-il faire?

Sauf avis contraire de votre médecin, buvez au moins 2 litres de liquide par jour pour favoriser le bon fonctionnement des reins, diluer le médicament et faciliter son élimination sans diminuer son efficacité.

Cet apport est d'autant plus important après avoir reçu une substance irritante pour la vessie.

Signes d'alerte

Si vous observez l'un des signes suivants, signalez-le immédiatement à votre oncologue ou à l'oncologue de garde (24h/24) afin de définir les mesures à prendre:

- sensations de brûlure lorsque vous urinez
- spasmes
- besoin urgent d'uriner sans en être capable
- présence de sang dans les urines

Contacts

Réception du Service d'oncologie médicale
Lu-Ve 8h-17h
Tél. +41 21 314 01 55

Urgences nuit, week-end et jours fériés
Tél. +41 21 314 11 11
Demandez l'oncologue de garde