

Surveillance active de la thyroïde

Qu'est-ce que c'est?

Une ablation peut être évitée pour certains cancers de la thyroïde s'ils sont de petite taille et limités à cet organe (carcinomes papillaires mesurant moins de 1 cm). La plupart de ces tumeurs tendent à rester stables ou à croître très lentement. Il convient donc parfois simplement de les observer et les «surveiller activement» par ultrason. Ce choix dépend:

- de l'aspect de la tumeur à l'ultrason
- des caractéristiques du-de la patient-e.

Cette attitude n'est en général pas recommandée pour les jeunes personnes. Elle peut très bien convenir aux personnes plus âgées, ou qui présentent d'autres maladies concomitantes, par exemple un autre cancer ou des problèmes cardiovasculaires.

Quel déroulement?

Les intervalles des contrôles par ultrason sont fixés par votre endocrinologue. Un suivi tous les 6 à 12 mois est habituel.

Le traitement présente-t-il des risques?

Il y a un faible risque que le cancer progresse lors de la surveillance. La prise en charge sera toutefois adaptée si l'on constate une augmentation significative de la taille de la tumeur, ou l'apparition de ganglions suspects au niveau du cou. Une opération pourra alors être envisagée.

Quelle couverture par les assurances?

Il s'agit d'un suivi en ambulatoire qui est couvert par l'assurance obligatoire des soins.

Contacts

Pr Gerasimos Sykiotis
Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme
CHUV
Avenue de la Sallaz 8 - SA08/02/250
1011 Lausanne
Tél. +41 21 314 06 06
Fax: +41 21 314 94 51